

HG

tuin
jardin

onkruidspray spray herbicide

Unkrautspray

HG onkruidspray

EIGENSCHAPPEN: Vetzuren werken in op ontwikkelde planten en worden geabsorbeerd door bladeren en groene stengels. Daarom moet overvullen van het product te allen tijde vermieden worden. In het bijzonder dient men er op te letten bladeren, takken en overhoutte basen van planten die men wil houden niet te raken. Het product werkt wanneer het wordt toegepast op de grond en verhindert de kieming van zaden niet. Het is dus niet zinvol het product preventief toe te passen op een oppervlak zonder onkruiden.

TOEPASSING / DOSIS: Voor toepassing op eenjarige onkruiden op verharde en onverharde permanent onbeboste terreinen, onder sierplanten (niet-houtachtig, niet bestemd voor consumptie). Bij voortvarende behandelings op eenmalig gebruik (een keer per seizoen) bij gunstige weersomstandigheden: zacht, voldoende zon en hoge luchtvochtigheid. Regen binnen de eerste uren na de behandeling vermindert de werking van het product.

Goed schudden voor gebruik. De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien. Indien u de fles eerder heeft gebruikt, kunnen er mogelijk resten van de vloeistof zijn achtergebleven in de spuitopening waardoor deze bij hergebruik minder goed zou kunnen functioneren. Wij adviseren u derhalve om bij hergebruik de spuitopening altijd eerst goed door te spoelen met behulp van heet water uit de kraan, bijvoorbeeld via de ontluichtingsgaten aan de zijkant van het schuimpompje. Dosis: 1 keer de hendel indrukken = 1,35 ml. Maximaal 59 hendelrukken / m². Een hendelruk levert 1,35 ml product af tegenheel totaal een oppervlakte van 17 cm² vegetatie of een cirkel met een diameter van 5,5 cm te behandelen.

Verbruik: 500 ml voor 6,25 m² onkruid.

Maximaal 2 toepassingen per 12 maanden. 1-2 toepassingen met een interval van minimaal 1 maand. Plant per plant plaatselijk behandelen met de trigger spray op een afstand van ongeveer 20 cm van het onkruid. Toe te passen wanneer de onkruiden in een jong stadium en in volle groei zijn. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (klikkeerstand).

Veiligheidsinstructies: 2 dagen alvorens opbouw de grond te bewerken, te zaaien, te stekken of aan te planten. De dosis wordt uitgedrukt per oppervlakte te verwijderen vegetatie en enkel een geïsoleerde behandeling op goed ontwikkelde onkruiden is toegestaan. De onkruiden enkel bevochtigen en niet bespuiten tot afdruppen.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN: Product uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. **SP0:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product in zijn verpakking geen water verontreinigt. - Niet toepassen op verharde permanent onbeboste terreinen (asfalt, beton, kasseien, grind,...) in de nabijheid van water (rivier, beek, sloot, vijver, putten) en riolen (goot, riolering,...)

BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN: De verpakking volledig ledigen. De lege verpakking mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Spuitoverschotten nooit in de riolering gieten. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervullen met het product of de lege verpakking.

VOORZORGSMAATREGELEN: Geef de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn. Dit product in zijn originele gesloten verpakking voorstrijf bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

AANWIJZINGEN VOOR EERSTE HULP: **EHBO:** Bij contact met de ogen: de ogen gedurende verschillende minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspiegel geopend blijft. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij contact met de huid: onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed uitspoelen. Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen. Bij inademing van het product: frisse lucht toelaten; bij klachten arts onbieden. Bij inademing van het product: als de klachten niet minderen, een arts raadplegen. **A:** Voor de geneesheer beschikbaar: symptomatische behandeling, geen speciale anti-stof bekend bij inname. **Fis:** Rechtstreeks vervoeren en bewaren.

HG spray herbicide

PROPRIETES: Les acides gras agissent sur les plantes développées et sont absorbés par les feuilles et tiges vertes. Raison pour laquelle il convient d'éviter en toutes circonstances que le produit se diffuse trop largement. Veillez notamment à ne pas toucher les feuilles, branches et cosses non récoltées des végétaux que vous souhaitez conserver. Le produit n'agit pas s'il est appliqué sur le sol et n'empêche pas la germination des graines. Il ne sert donc à rien d'appliquer le produit préventivement sur une surface sans mauvaises herbes.

UTILISATION/DOSAGE: Destiné à être appliqué sur les mauvaises herbes annuelles, sur terrains meubles, non cultivés en permanence terrains revêtus, non cultivables, parmi les plantes annuelles, sans ligneuses et non destinées à la consommation. Traiter de préférence par temps sec (ni pluie ni rosée) et par conditions météorologiques favorables: temps doux, ensoleillement suffisant et hygrométrie élevée. Des précipitations dans les heures qui suivent le traitement auront pour effet d'en amoindrir l'efficacité.

Bien secouer avant usage. Appuyer sur le bec de pulvérisation et le tourner d'un quart de tour. Si vous avez déjà utilisé le flacon, il est possible que des résidus de produit soient restés dans l'orifice du vaporisateur, de sorte que celui-ci peut moins bien fonctionner. Nous vous conseillons donc, lorsque vous réalisez le vaporisateur, de toujours commencer par bien le rincer à l'eau chaude du robinet, par exemple via les orifices d'aération situés sur le côté du mousser. Dose: 1 pression sur la gâchette = 1,35 ml. Max. 59 pressions sur la gâchette / m². Une pression sur la gâchette correspond à 1,35 ml de produit. Cette quantité permet de traiter une superficie de 17 cm² de végétation, soit un cercle d'un diamètre de 5,5 cm.

Consommation: 500 ml pour 6,25 m² de mauvaises herbes.

Max. 2 applications par 12 mois. 1 ou 2 applications à intervalle de 1 mois au moins. Traiter les mauvaises herbes localement, plante par plante, avec le vaporisateur, à une distance d'environ 20 cm. Peut être appliqué à un stade précoce et lorsque les mauvaises herbes sont en pleine croissance. Après usage, retourner le bec de pulvérisation d'un quart de tour (position de blocage).

Délai de sécurité: 2 jours avant de travailler la terre, de semer, de repiquer ou de planter. La dose s'exprime en superficie de végétation à éliminer. Seul un traitement localisé sur des mauvaises herbes bien développées est autorisé. Ne pas détrempier les mauvaises herbes, mais juste les humidifier.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION: Produit destiné uniquement aux amateurs de jardinage. **SP0:** Après traitement, ne marcher sur la parcelle/surface qu'une fois le produit sec. **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. - Ne pas traiter sur terrains revêtus non cultivables (comme le bitume, le béton, les pavés, graviers,...) à proximité des points d'eau (rivière, ruisseau, fosse, mare, puits) et des égouts (caniveaux, avaloirs,...).

TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT: Vider complètement l'emballage. L'emballage vide ne peut être utilisé à d'autres fins. Ne jamais verser les surplus dans les égouts. Ne pas polluer les étangs, cours d'eau et canaux avec le produit ou son emballage.


MESURES DE PRÉCAUTION: Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Conserver le produit sous cello dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

CONSIGNES DE PREMIERS SECOURS: PREMIERS SECOURS: En cas de contact avec les yeux: rincer abondamment pendant plusieurs minutes avec de l'eau courante en maintenant les paupières ouvertes. En cas d'irritation oculaire persistante: consulter un médecin. En cas de contact cutané: laver immédiatement à l'eau savonneuse et bien rincer. En cas d'irritation cutanée persistante, consulter un médecin. En cas d'inhalation du produit, se mettre à l'air frais. En cas de malaise, pas d'ingestion du produit: si les symptômes persistent, consulter un médecin. **A. Pour le médecin préconique:** traitement symptomatique, antidote anticholinergique spécial connu lors de la prise. **Transporter et conserver le flacon à la verticale.**


- binnen enkele uren zichtbaar resultaat
- biologisch afbreekbaar

- résultat visible en quelques heures
- biodégradable

glyfosaatvrij
sans glyphosate 500 ml e



EUH401- Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P270- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
EUH401- Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. P102- Tenir hors de portée des enfants. P270- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P501- Éliminer le contenu/le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou équivalents.
EUH401- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P270- Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P501- Inhalt/Behälter einem Sammelpunkt für gefährlichen Abfall oder Sonderabfall zuführen.



0565100105003 1903

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum/
Pour des informations complémentaires, contactez le Centre
Antidote / Für weitere Informationen wenden Sie sich an das
Gifbehördenzentrum (Antigifzentrum): Tel.: +32 (0) 70 245.245.
10510 G/B. HG Onkruidspray / HG spray herbicide
HG Onkruidspray. AL (Vloeistof voor toepassing zonder
verdunding) op basis van 35,8 g/l vetzuren. AL (Liquide destiné à
être utilisé sans dilution) à base de 35,8 g/l d'acides gras.
AL (Flüssigkeit zur Anwendung ohne Verdünnung) auf Basis
von 35,8 g/l Fettsäuren. Een erkenning van / Une agrégation de
l'En/Produkt von The Woodstream Chemical Corporation
c/o Export International Ltd. The Lenz, Hornbeam Business
Park, Middlesbrough, MYPK35 8JH, UK
GE Verdelde door/distribué par Vertriebs durch/
distribué par HG International v.l., Darnleisweg
70, 4352 Elfrink, Nederland, Tel.: +31
(0)36-5494700
Chargé / numéro de lot / Chargé(e): zie
onderaan fles / voir ci-dessous / unterer
Flaschenrand.



* Achtung: siehe Innenseite
Die Flasche aufrecht stehend
transportieren und lagern.

HG Unkrautspray

EIGENSCHAFTEN: Fettsäuren wirken auf entwickelte Pflanzen ein und werden von Blättern und grünen Stängeln absorbiert. Daher sind Verwendungen des Produktes unbedingt zu vermeiden. Insbesondere muss beachtet werden, dass keine Blätter, Zweige, und unverholzte Rinde von Pflanzen, die erhalten bleiben sollen, berührt werden dürfen. Das Produkt wirkt nicht, wenn es auf den Boden aufgetragen wird und es verhindert nicht die Aufkeimung von Samen. Eine Präventive Anwendung des Produktes auf Flächen ohne Unkraut ist daher nicht sinnvoll.

ANWENDUNG / DOSIERUNG: Zur Anwendung auf einjährigem Unkraut auf nicht befestigten und unbefestigten, dauerhaft befestigten, nicht befallenen Flächen sowie unter Zierbäumen und -sträuchern (nicht holzartig und nicht zum Verzehr geeignet). Vorzugsweise auf trockenem Gewächs (ohne Regen oder Tau) und bei günstigen Witterungsbedingungen anwenden: bei mildem Wetter, ausreichender Sonne und hoher Luftfeuchtigkeit. Regen innerhalb der ersten Stunden nach der Behandlung beeinträchtigt die Wirksamkeit des Produktes.

Vor Gebrauch gut schütteln. Den Sprühaufsatz an der Vorderseite eindrücken und um ein Viertel drehen. Falls Sie die Flasche bereits eher benutzt haben, können Reste des Flüssigmittels in der Sprühöffnung zurückgeblieben sein, was die Funktion bei erneuter Verwendung möglicherweise beeinträchtigt. Bei erneuter Verwendung empfehlen wir Ihnen deshalb, die Sprühöffnung zunächst mit heißem Leitungswasser durchzuspielen, zum Beispiel über die Entlüftungslöcher an der Seite des Schaumaufsatzes. Dosierung: 1 Mal den Hebel betätigen = 1,35 ml. Pro m² den Hebel maximal 59 Mal betätigen. Den Hebel einmal betätigen ergibt 1,35 ml Produkt; dies reicht für die Behandlung einer Fläche von 17 cm² Bewuchs oder einem Kreis mit 5,5 cm Durchmesser.

Verbrauch: 500 ml für 6,25 m² Unkraut.

Maximal 2 Anwendungen pro 12 Monate. 1 bis 2 Anwendungen im Intervall von minimal 1 Monat. Alle Pflanzen einzeln mit dem Trigger Spray im Abstand von etwa 20 cm zum Unkraut behandeln. Auf Unkraut von frühen bis fortgeschrittenen Wachstumsstadien anzuwenden. Nach Gebrauch den Sprühaufsatz wieder um ein Viertel zurückdrehen (Vorriegelung).

Sicherheitswartezeit: 2 Tage vor dem erneuten Bearbeiten, Einsäen, Stecken oder Bepflanzen der Bodenfläche. Die Dosierung gilt pro Fläche an zu bekämpfendem Bewuchs und darf ausschließlich zur örtlichen Behandlung auf gut entwickeltem Unkraut verwendet werden. Das Unkraut nur befeuchten, nicht tropfnass besprühen.

SPEZIELLE ANWENDUNGSBEDINGUNGEN: Das Produkt ist nur für die nicht professionelle Verwendung bestimmt. SPO: Nach der Behandlung die Flächen/ Oberflächen erst wieder betreten, wenn die Sprühtätigkeit getrocknet ist. SP1: Vermeiden Sie unbedingt eine Verunreinigung von Gewässern durch das Produkt oder seine Verpackung. - Nicht auf befestigten, nicht-bestellten Flächen (Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster, Kies,...) in direkter Nähe von Wasser (Fluss, Bach, Wassergraben, Teich, Brunnen) und Abwasserleitungen (Flinstein, Kanalisation,...) anwenden.

UMGANG MIT LEEVERPACKUNGEN UND PRODUKTRESTEN: Die Verpackung vollständig leeren. Die Leerverpackungen dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Pflanzenschutzreste keinesfalls in die Kanalisation schütten. Das Produkt beziehungsweise die Leerverpackung darf nicht in Teiche, Wasserläufe oder Gräben gelangen.

VORSORGE MASSNAHMEN: Vor Gebrauch stets die üblichen Vorsorgemaßnahmen beachten, die bei Verwendung von Pflanzenschutzmitteln gelten. Dieses Produkt in einem sauberen, trockenen, abgeschlossenen Raum, der speziell hierfür vorgesehen ist, in der geschlossenen Originalverpackung frostfrei aufbewahren.

ANWEISUNGEN FÜR ERSTE HILFE:

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN: Bei Kontakt mit den Augen: Die leicht geöffneten Augen einige Minuten lang unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung der Augen: ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Kontakt mit der Haut unverzüglich mit Wasser und Seife waschen und gut nachspülen. Bei anhaltender Hautreizung: ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Einatmen des Produktes: frische Luft zuführen; bei Beschwerden: ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Verschlucken des Produktes: wenn die Beschwerden nicht abklingen, ärztliche Hilfe hinzuziehen. A. Für den Arzt präklinisch: symptomatische Behandlung, keine speziellen Antistoffe bekannt bei Einnahme. Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern.